

МКУК «Оричевская районная ЦБС»
Центральная детская библиотека



Кобчик - птица 2021 года

*Информационный дайджест
для детей среднего школьного возраста*

пгт. Оричи,
2021 г.

**1996 года ежегодно Союз охраны птиц
России проводит кампанию «Птица года».**

Героями года были:

1996 г. – коростель;

1997 г. – жаворонок;

1998 г. – журавль;

1999 г. – ласточка;

2000 г. – синица;

2001 г. – скворец;

2002 г. – пустельга;

2003 г. – кроншнеп;

2004 г. – аист;

2005 г. – сова;

2006 г. – чайка;

2007 г. – зимородок;

2008 г. – снегирь;

2009 г. – лебедь;

2010 г. – чибис;

2011 г. – белая трясогузка;

2012 г. – варакушка;

2013 г. – орлан – белохвост;

2014 г. – черный стриж;

2015 г. – горихвостка;

2016 г. – удод;

2017 г. – буроголовая гаичка;

2018 г. – скопа;

2019 г. – обыкновенная горлица;

2020 г. – серый журавль;

2021 г. – кобчик.

Кобчик – это средне - маленький, длиннокрылый вид птиц. Взрослый самец серо-голубой, за исключением красного низа хвоста и лап. У самки серая спина и крылья, оранжевая голова и нижняя часть тела, белая голова с черными полосками у глаз и «усами». Молодые птицы сверху коричневые, внизу с темными прожилками, узор на голове как у самок. Кобчики в длину 28-34 см, размах крыльев 65-75 см.



Естественная среда обитания

Встречается вид на всех видах открытой местности, окаймлённой насаждениями или с редкими деревьями, где водятся многочисленные популяции жертв, особенно насекомых. К ним относятся:

- [степи и лесистые степи](#);
- галерейные леса вдоль берегов рек, пересекающие луга;
- [болота](#) или топи, торфяники;
- осушенные и орошаемые поля;
- большие лесные поляны;
- обгоревшие участки;
- парки, сады, рощи (даже в пределах городов);
- предгорья гор.

Кобчики не строят гнезда, колониальные тенденции вида смещают выбор среды обитания в направлении



районов, где ранее размножались крупные птицы (например, врановые) сезонно освобождаются подходящие гнезда, предпочтительно в кронах высоких плотно растущих деревьев любых видов, широколиственных или хвойных.

Воздушные провода, столбы и другие сооружения используют кобчики для отдыха между сеансами охоты на насекомых.

Чем питается кобчик

Питаются кобчики в основном насекомыми, но охотятся и на мелких позвоночных, включая земноводных, рептилий и млекопитающих. Птицы парят, разыскивая скопления насекомых. Большая часть воздушной охоты происходит в середине дня, утром и ближе к вечеру птицы садятся на деревья или линии электропередач, где отдыхают и набираются сил. В зимнем ареале на юге Африки охотятся стаями, к кобчикам присоединяются малые пустельги. **Птицы кормятся:**

- термитами;
- скоплениям саранчи;
- другим источникам пищи.

Размножение и потомство кобчиков

Кобчик гнездится на западе Восточной Европы, в центральной и северно-центральной Азии, с основным ареалом от Беларуси на юг до Венгрии, северной Сербии и Черногории, Румынии, Молдовы и восточной Болгарии, на восток через Украину и северо-запад к югу

России и северу Казахстана, до северо-запада Китая и верховий реки Лены (Россия).

По прибытии на место размножения в конце апреля самец проводит краткую демонстрацию брачного оперения, за которым следует несложный выбор пары. Кладка яиц происходит вскоре после этого (в течение 3 недель после прибытия), и птицы затем инкубируют яйца в больших колониях заброшенных (или захваченных) гнезд.



3-5 яиц инкубируют оба члена пары в течение 21-27 дней, начиная с кладки второго яйца. Молодняк появляется на свет с интервалами в 1 или 2 дня, окрыляется спустя 26-27 дней.

Гнездовые колонии кобчики начинают покидать примерно на третьей неделе августа и к концу того же месяца места размножения пустеют.

Куда перелетают кобчики зимой

Миграция начинается в середине сентября. Зимует вид кобчиков на юге, от Южной Африки на север до южной части Кении.



Основные угрозы птицам

Общая численность кобчиков составляет около 300 - 800 тысяч экземпляров, но последние данные свидетельствуют о том, что в некоторых регионах поголовье птиц значительно сокращается. В Европе насчитывают 26–39 тысяч пар (что составляет 25–49% от общей численности).

В ключевых группах России и в Украине число кобчиков снизилось более чем на 30% за 10 лет (3 поколения). В Восточной Сибири этот вид исчезает из Прибайкалья.

В Венгрии насчитывают 800-900 пар, в Болгарии осталось мало активных колоний.

Популяции в Центральной Азии стабильны и распространены в подходящих местообитаниях (особенно в лесостепной зоне), и нет свидетельств

того, что популяция там уменьшается.



**Дополнительную информацию
о соколе – кобчике вы можете найти:**

1. Иваницкий В. В. Я познаю мир: Птицы. Энциклопедия / В. В. Иваницкий. – Москва : Астрель, 2000. – 398 с. – Текст (визуальный) : непосредственный.

2. Птицы СССР / В. Е. Флинт, Р. Л. Беме и др. – Москва : Мысль, 1968. – 637 с. – Текст (визуальный) : непосредственный.

3. Школьник Ю. К. Птицы. Полная энциклопедия / Ю. К. Школьник. – Москва : Эксмо, 2007. – ил. – (Атласы и энциклопедии). – Текст (визуальный) : непосредственный.

Для составления дайджеста
использованы материалы Интернет ресурсов.

Составитель: Н.А. Сапегина,

Наш адрес: пгт Оричи,

ул. Молодая Гвардия, д. 32

Тел: +7 (83354) 2-16-30

Часы работы: 09.00 – 18.00

Выходной: суббота

E-mail: orichi_cbs_db@mail.ru

Сайт: <http://orichi-cbs.ru>

